

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valtellina e Alto Lario	DIPARTIMENTO / STRUTTURA DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI DOCUMENTO	01 – Mod LA135	
	Modulo richiesta per ricerca anticorpi anti PF4 (HIT o VITT)		INDICE DI REVISIONE 1

Spazio per etichetta anagrafica

Cognome
nome

Data di
nascita:

Reparto

____/____/____	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

DATA PRELIEVO ____/____/____

NOTE: _____

eventuale reparto di appoggio: _____

anticorpi anti PF4 per sospetto VITT (provetta t.oro, esame 3428), in caso di sospetta trombosi correlata a vaccino Covid. Viene inviato al Servizio Trasfusionale Policlinico Milano.

Sede trombosi _____ Vaccino somministrato _____ in data: _____

anticorpi anti PF4 per sospetto HIT (provetta t.azzurro, esame 048H) richiedibile in urgenza, **PER I PRESIDII DI CHIAVENNA e SONDALO** contattare il reperibile di Laboratorio

La ricerca di anticorpi anti PF4 per sospetta Trombocitopenia eparina-indotta (HIT) si esegue solamente

- in pazienti che fanno o hanno fatto terapia eparinica
- che abbiano punteggio ≥ 4 del seguente 4T score da compilare:

Parametro	Condizione riscontrata	punteggio
1. Trombocitopenia	Diminuzione della conta piastrinica >50 per cento E nadir $\geq 20.000/\text{microl}$	2
	Diminuzione della conta piastrinica da 30 a 50 per cento O nadir da $10.000/\text{microl}$ a $19.000/\text{microl}$	1
	Diminuzione della conta piastrinica <30 per cento O nadir $<10.000/\text{microl}$	0
2. Tempi di diminuzione della conta piastrinica?	Chiara insorgenza fra i giorni 5 e 10 di esposizione all'eparina, O diminuzione della conta piastrinica il giorno ≤ 1 se entro gli ultimi 30 giorni prima dell'esposizione all'eparina	2
	Coerente con la diminuzione della conta piastrinica nei giorni dal 5 al 10, ma non chiara (per es. conte piastriniche mancanti), O insorgenza dopo il giorno 10, O diminuzione ≤ 1 giorno con precedente esposizione all'eparina entro 30-100 giorni	1
	Diminuzione della conta piastrinica a <4 giorni senza recente esposizione all'eparina	0
3. Trombosi o altre sequele?	Nuova trombosi confermata, necrosi cutanea o reazione sistemica acuta in seguito a bolo di eparina non frazionata per via endovenosa	2
	Trombosi progressiva o ricorrente, lesioni cutanee non necrotizzanti (eritematose), o sospetta trombosi non dimostrata	1
	Nessuna	0
4. Presenti altre cause di trombocitopenia?	Nessuna evidente	2
	Possibile	1
	Definita	0
4 T SCORE - INTERPRETAZIONE	6 - 8 punti: Alta probabilità	SOMMA->
	4 - 5 punti: Probabilità intermedia	
	0 - 3 punti: Bassa probabilità	

IL MEDICO RICHIEDENTE _____